



3ª ETAPA VACINAÇÃO

- **Pessoas com comorbidades: pessoas com 18 a 59 anos com uma ou mais das comorbidades pré-determinadas no Quadro abaixo.**
- **Pessoas com deficiência permanente: para fins de inclusão na população alvo para vacinação, serão considerados indivíduos de 18 a 59 anos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações:**
 - a) **Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;**
 - b) **Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;**
 - c) **Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;**
 - d) **Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.**

| QUADRO: COMORBIDADES |

| **Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a COVID-19** |

Grupo de comorbidades	Descrições
Diabetes mellitus	Qualquer indivíduo com diabetes
Pneumopatias crônicas graves	Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).
Hipertensão Arterial Resistente (HAR)	HAR = quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlado em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.
Hipertensão Arterial estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Vigilância Epidemiológica

Av. Vereador Olímpio Grande, N° 133, Porto, Itabaiana - SE, CEP: 49510-200

(79) 9 8862-4977 – Email: vigilanciaepidemiologica.ita@gmail.com

Hipertensão Arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidades	PA sistólica entre 140 e 170mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.
Insuficiência cardíaca (IC)	IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada, em estágio B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association.
Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária.
Cardiopatia hipertensiva	Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões e outros órgãos-alvo)
Síndromes coronarianas	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras).
Valvopatias	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).
Miocardopatias e Pericardiopatias	Miocardopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática.
Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas	Aneurisma, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.
Arritmias cardíacas	Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).
Cardiopatias congênita no adulto	Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdio.
Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados	Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressyncronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).
Doença cerebrovascular	Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.
Doença renal crônica	Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60ml/min/1,73m ²) e/ou síndrome nefrótica.
Imunossuprimidos	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Vigilância Epidemiológica

Av. Vereador Olímpio Grande, N° 133, Porto, Itabaiana - SE, CEP: 49510-200

(79) 9 8862-4977 – Email: vigilanciaepidemiologica.ita@gmail.com

	recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasia hematológicas.
Hemoglobinopatias graves	Doença falciforme e talassemia maior (anemia falciforme).
Obesidade mórbida	Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 .
Síndrome de down	Trissomia do cromossomo 21.
Cirrose hepática	Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, Brasília/DF (15/03/2021).

